

6. Druhy strašilek

Phyllium bioculatum

Lupenitka dvouooká

Indie, Jáva, Borneo, Sumatra, Cejlon

VELIKOST: až 9 cm

VÝVOJ: vývoj do dospělosti trvá 6 měsíců

SVĚTLO, TEPLA, VLHKOST: běžná pokojová teplota, vlhkost může být vyšší


VÝŠKA TERÁRIA: minimálně 30 cm

POTRAVA: ostružiník, dub

♀
samice




Lupenitka dvouoká je pojmenovaná pro dvě tečky na těle.



NYMFY LUPENITKY DVOUOKÉ


Jsou po vylíhnutí sytě červené — výraznou barvou odrazují predátory, následně se zbarví do cihlové a krásně splynou s hlínou či kůrou. Jakmile zdolá nymfa cestu až k listí, začne se barvit do zelena.

vajíčko




nymfa

♂
samec



POZOR! Samci lupenítek umí létat!



LUPENITKY PATŘÍ MEZI TY NEJNENÁPADNĚJŠÍ Z NENÁPADNÝCH!

Napodobování listů dřevin je dovedeno k dokonalosti! Na křídlech můžeme pozorovat nervaturu či osychající okraje. Pokud dojde k tomu, že mají strašilky okousaná křídélka — jejich poraněné okraje se věrně podobají stejně poškozenému listu rostliny.

Klidně se může stát, že návštěva tvoje mazlíčky zpočátku vůbec neuvidí.

U řady druhů lupenítek jsou podmínky chovu prakticky stejné! Takže když zvládneš jeden druh, zvládneš i ty další.

Další do tvého chovu mohou být: *Phyllium philippinicum* (**Lupenitka filipínská**) nebo *Phyllium giganteum* (**Lupenitka obrovská**)

Mám nové mazlíčky!

Kde?!

